

APÊNDICE 5. Parâmetros fitossociológicos das espécies da floresta ombrófila aberta com cipó e palmeira da área de estudo da região de Belo Monte, Pará. NI - número de indivíduos; DR - densidade relativa; DoR - dominância relativa; FR - frequência relativa; IVC - índice de valor de cobertura; IVI - índice de valor de importância da espécie.

(continua)

ESPÉCIE	NI	DR (%)	DoR (%)	FR (%)	IVC (%)	IVI (%)
<i>Bertholletia excelsa</i>	21	1.48	15.30	1.42	5.59	6.07
<i>Alexa grandiflora</i>	42	2.96	5.78	1.90	2.91	3.54
<i>Vouacapoua americana</i>	40	2.81	4.08	2.01	2.30	2.97
<i>Theobroma speciosum</i>	67	4.71	1.55	2.25	2.09	2.84
<i>Euterpe oleracea</i>	79	5.56	1.46	0.95	2.34	2.66
<i>Inga alba</i>	35	2.46	2.07	2.49	1.51	2.34
<i>Tachigali mymercophila</i>	20	1.41	3.51	1.54	1.64	2.15
<i>Gustavia augusta</i>	38	2.67	0.88	2.25	1.18	1.93
<i>Chimarrhis turbinata</i>	3	0.21	4.96	0.36	1.72	1.84
<i>Guarea</i> sp.	31	2.18	1.01	1.30	1.06	1.50
<i>Virola michelii</i>	23	1.62	1.50	1.30	1.04	1.47
<i>Trichilia</i> sp.	23	1.62	1.21	1.54	0.94	1.46
Sp 13	30	2.11	0.39	1.66	0.83	1.39
<i>Inga edulis</i>	26	1.83	0.87	1.42	0.90	1.37
<i>Guapira venosa</i>	27	1.90	1.05	1.07	0.98	1.34
<i>Matisia paraensis</i>	18	1.27	1.81	0.71	1.03	1.26
<i>Dialium guianense</i>	21	1.48	0.93	1.30	0.80	1.24
<i>Gustavia hexapetala</i>	22	1.55	0.41	1.66	0.65	1.20
<i>Brosimum guianensis</i>	11	0.77	1.79	0.95	0.86	1.17
<i>Maquira sclerophylla</i>	18	1.27	1.40	0.59	0.89	1.09
<i>Protium apiculatum</i>	19	1.34	0.73	0.95	0.69	1.00
<i>Guatteria poeppigiana</i>	13	0.91	0.74	1.30	0.55	0.99
<i>Bellucia glossularioides</i>	19	1.34	0.88	0.71	0.74	0.98
<i>Neea oppositifolia</i>	18	1.27	0.51	1.07	0.59	0.95
<i>Socratea exorrhiza</i>	23	1.62	0.60	0.47	0.74	0.90
<i>Astronium lecontei</i>	8	0.56	1.57	0.47	0.71	0.87
<i>Cecropia palmata</i>	14	0.99	0.73	0.83	0.57	0.85
<i>Iriarte exorrhiza</i>	18	1.27	0.35	0.83	0.54	0.82
<i>Toulicia guianensis</i>	15	1.06	0.41	0.95	0.49	0.81
<i>Apuleia molaris</i>	2	0.14	2.00	0.24	0.71	0.79
<i>Carapa guianensis</i>	10	0.70	1.02	0.59	0.57	0.77
<i>Tetragastris altissima</i>	8	0.56	1.34	0.36	0.63	0.75
<i>Bellucia guianensis</i>	11	0.77	0.52	0.95	0.43	0.75
<i>Pouteria</i> sp.	11	0.77	0.38	1.07	0.38	0.74
<i>Bauhinia acreana</i>	12	0.84	0.15	1.18	0.33	0.73
<i>Jacaranda copaia</i>	9	0.63	0.67	0.83	0.43	0.71
<i>Neea glomerulifolia</i>	10	0.70	0.44	0.95	0.38	0.70
<i>Talisia</i> sp.	11	0.77	0.34	0.95	0.37	0.69
<i>Thyrsodium paraense</i>	10	0.70	0.28	1.07	0.33	0.68
<i>Lecythis lurida</i>	10	0.70	0.26	1.07	0.32	0.68
<i>Rinorea pubiflora</i>	6	0.42	1.13	0.47	0.52	0.67
<i>Cecropia sciadophylla</i>	8	0.56	0.61	0.83	0.39	0.67
<i>Protium robustum</i>	13	0.91	0.28	0.71	0.40	0.64
<i>Holopixidium itacaiunensis</i>	10	0.70	0.23	0.95	0.31	0.63
<i>Ocotea caudata</i>	11	0.77	0.29	0.71	0.35	0.59
<i>Oenocarpus bacaba</i>	9	0.63	0.42	0.71	0.35	0.59
<i>Schizolobium amazonicum</i>	13	0.91	0.43	0.36	0.45	0.57
<i>Ocotea</i> sp.	7	0.49	0.72	0.47	0.41	0.56
<i>Mezilaurus itauba</i>	5	0.35	0.83	0.47	0.39	0.55
<i>Attalea maripa</i>	6	0.42	0.58	0.59	0.34	0.53
<i>Nectandra pulverulenta</i>	2	0.14	1.18	0.24	0.44	0.52
<i>Hevea brasiliensis</i>	6	0.42	0.77	0.36	0.40	0.51
<i>Fusaea longifolia</i>	8	0.56	0.20	0.71	0.25	0.49
<i>Casearia arborea</i>	6	0.42	0.32	0.71	0.25	0.48
<i>Inga thibaudiana</i>	9	0.63	0.21	0.59	0.28	0.48
<i>Naucleopsis caloneura</i>	7	0.49	0.12	0.83	0.20	0.48
<i>Pouteria lasiocarpa</i>	7	0.49	0.22	0.71	0.24	0.48
<i>Ormosia coutinhoi</i>	4	0.28	0.76	0.36	0.35	0.47
<i>Miconia lepidota</i>	7	0.49	0.17	0.71	0.22	0.46
<i>Stryphnodendron pulcherrimum</i>	7	0.49	0.36	0.47	0.28	0.44
<i>Jacaratia spinosa</i>	5	0.35	0.47	0.47	0.27	0.43
<i>Protium pallidum</i>	4	0.28	0.52	0.47	0.27	0.42
<i>Terminalia amazonica</i>	1	0.07	1.06	0.12	0.38	0.42
<i>Inga heterophylla</i>	7	0.49	0.28	0.47	0.26	0.41
<i>Vochysia obscura</i>	2	0.14	0.86	0.24	0.33	0.41
<i>Helicostylis tomentosa</i>	8	0.56	0.15	0.47	0.24	0.40
<i>Guazuma ulmifolia</i>	6	0.42	0.40	0.36	0.27	0.39
<i>Nectandra cuspidata</i>	5	0.35	0.23	0.59	0.19	0.39
<i>Guarea silvatica</i>	6	0.42	0.10	0.59	0.18	0.37
<i>Molia lucens</i>	4	0.28	0.48	0.36	0.25	0.37

APÊNDICE 5. Parâmetros fitossociológicos das espécies da floresta ombrófila aberta com cipó e palmeira da área de estudo da região de Belo Monte, Pará. NI - número de indivíduos; DR - densidade relativa; DoR - dominância relativa; FR - frequência relativa; IVC - índice de valor de cobertura; IVI - índice de valor de importância da espécie.

(continua)

ESPÉCIE	NI	DR (%)	DoR (%)	FR (%)	IVC (%)	IVI (%)
<i>Sterculia speciosa</i>	6	0.42	0.20	0.47	0.21	0.36
<i>Inga capitata</i>	5	0.35	0.13	0.59	0.16	0.36
<i>Pouteria krukovii</i>	4	0.28	0.54	0.24	0.27	0.35
<i>Peltogyne paniculatum</i>	3	0.21	0.46	0.36	0.22	0.34
<i>Pourouma guianensis</i>	5	0.35	0.21	0.47	0.19	0.34
<i>Sapium manieri</i>	5	0.35	0.31	0.36	0.22	0.34
<i>Hymenaea parviflora</i>	5	0.35	0.18	0.47	0.18	0.33
<i>Spondias mombim</i>	4	0.28	0.34	0.36	0.21	0.32
<i>Theobroma grandiflorum</i>	5	0.35	0.15	0.47	0.17	0.32
<i>Lecythis holcogyne</i>	1	0.07	0.76	0.12	0.28	0.32
<i>Sloanea</i> sp.	2	0.14	0.55	0.24	0.23	0.31
<i>Tapirira guianensis</i>	4	0.28	0.17	0.47	0.15	0.31
<i>Enterolobium contortissilicum</i>	3	0.21	0.35	0.36	0.19	0.31
<i>Rollinia exsua</i>	5	0.35	0.08	0.47	0.15	0.30
<i>Bombax longipedicelatum</i>	6	0.42	0.13	0.36	0.18	0.30
<i>Zanthoxylum</i> sp.	4	0.28	0.14	0.47	0.14	0.30
<i>Cupania</i> sp.	5	0.35	0.06	0.47	0.14	0.30
<i>Cordia bicolor</i>	4	0.28	0.24	0.36	0.17	0.29
<i>Tachigali paniculata</i>	4	0.28	0.12	0.47	0.13	0.29
<i>Annona</i> sp.	4	0.28	0.11	0.47	0.13	0.29
<i>Quararibea</i> sp.	4	0.28	0.21	0.36	0.16	0.28
<i>Pterocarpus rohiri</i>	3	0.21	0.27	0.36	0.16	0.28
<i>Syagrus</i> sp.	5	0.35	0.11	0.36	0.16	0.27
<i>Symplocos guianensis</i>	5	0.35	0.12	0.36	0.16	0.27
<i>Apeiba echinata</i>	3	0.21	0.25	0.36	0.15	0.27
<i>Brosimum potabili</i>	5	0.35	0.20	0.24	0.18	0.26
<i>Cordia nodosa</i>	3	0.21	0.22	0.36	0.14	0.26
<i>Pseudolmedia murure</i>	5	0.35	0.08	0.36	0.14	0.26
<i>Rinorea flavescens</i>	4	0.28	0.27	0.24	0.18	0.26
<i>Simaruba amara</i>	3	0.21	0.23	0.36	0.15	0.26
<i>Pourouma digitata</i>	3	0.21	0.20	0.36	0.14	0.26
<i>Xylopia nitida</i>	3	0.21	0.20	0.36	0.14	0.26
<i>Astrocaryum tucuma</i>	3	0.21	0.20	0.36	0.14	0.25
<i>Parkia multijuga</i>	3	0.21	0.19	0.36	0.13	0.25
<i>Pouteria reticulata</i>	3	0.21	0.18	0.36	0.13	0.25
<i>Lecythis pisonis</i>	3	0.21	0.12	0.36	0.11	0.23
<i>Myrcia atramentifera</i>	3	0.21	0.13	0.36	0.11	0.23
<i>Schefflera morototoni</i>	3	0.21	0.12	0.36	0.11	0.23
<i>Sterculia pruriens</i>	3	0.21	0.12	0.36	0.11	0.23
<i>Quararibea guianensis</i>	4	0.28	0.15	0.24	0.14	0.22
<i>Dipteryx odorata</i>	1	0.07	0.47	0.12	0.18	0.22
<i>Duguetia</i> sp.	3	0.21	0.20	0.24	0.14	0.22
<i>Eugenia coffeaeifolia</i>	3	0.21	0.09	0.36	0.10	0.22
<i>Protium crenatum</i>	3	0.21	0.09	0.36	0.10	0.22
<i>Cassia leiandra</i>	3	0.21	0.08	0.36	0.10	0.21
<i>Helicostylis pedunculata</i>	3	0.21	0.07	0.36	0.09	0.21
<i>Zygia ramiflora</i>	2	0.14	0.38	0.12	0.17	0.21
<i>Inga marginata</i>	3	0.21	0.06	0.36	0.09	0.21
<i>Capparis coccolobifolia</i>	3	0.21	0.05	0.36	0.09	0.21
<i>Pouteria caimito</i>	3	0.21	0.17	0.24	0.13	0.20
<i>Radkoffereia macrocarpa</i>	3	0.21	0.05	0.36	0.09	0.20
<i>Rollinia</i> sp.	3	0.21	0.04	0.36	0.09	0.20
<i>Indet Camurim</i>	3	0.21	0.15	0.24	0.12	0.20
<i>Ragala</i> sp.	3	0.21	0.16	0.24	0.12	0.20
<i>Sagotia racemosa</i>	4	0.28	0.06	0.24	0.11	0.19
<i>Parkia ulei</i>	3	0.21	0.12	0.24	0.11	0.19
<i>Abarema jupumba</i>	2	0.14	0.16	0.24	0.10	0.18
<i>Laetia procera</i>	2	0.14	0.16	0.24	0.10	0.18
<i>Parkia nitida</i>	3	0.21	0.10	0.24	0.10	0.18
<i>Cynometra bauhinifolia</i>	2	0.14	0.27	0.12	0.14	0.18
<i>Crepidospermum goudotianum</i>	3	0.21	0.07	0.24	0.10	0.17
<i>Virola surinamensis</i>	2	0.14	0.27	0.12	0.14	0.17
<i>Protium decandrum</i>	2	0.14	0.13	0.24	0.09	0.17
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	2	0.14	0.13	0.24	0.09	0.17
<i>Aspidosperma carapanauba</i>	1	0.07	0.31	0.12	0.13	0.17
<i>Inga microcalyx</i>	3	0.21	0.05	0.24	0.09	0.17
<i>Marmaroxylon racemosum</i>	3	0.21	0.05	0.24	0.09	0.17

APÊNDICE 5. Parâmetros fitossociológicos das espécies da floresta ombrófila aberta com cipó e palmeira da área de estudo da região de Belo Monte, Pará. NI - número de indivíduos; DR - densidade relativa; DoR - dominância relativa; FR - frequência relativa; IVC - índice de valor de cobertura; IVI - índice de valor de importância da espécie.

(continua)

ESPÉCIE	NI	DR (%)	DoR (%)	FR (%)	IVC (%)	IVI (%)
<i>Cecropia distachya</i>	2	0.14	0.11	0.24	0.09	0.16
<i>Chaunochiton kappleri</i>	2	0.14	0.12	0.24	0.09	0.16
<i>Attalea martiniana</i>	2	0.14	0.10	0.24	0.08	0.16
<i>Inga stipularis</i>	2	0.14	0.10	0.24	0.08	0.16
<i>Maquira guianensis</i>	3	0.21	0.03	0.24	0.08	0.16
<i>Guarea trichilioides</i>	2	0.14	0.09	0.24	0.08	0.16
<i>Guatteria schomburgkiana</i>	2	0.14	0.09	0.24	0.08	0.16
<i>Swartzia laurifolia</i>	2	0.14	0.09	0.24	0.08	0.16
<i>Eschweilera observa</i>	1	0.07	0.27	0.12	0.12	0.15
<i>Vismia baccifera</i>	2	0.14	0.08	0.24	0.07	0.15
<i>Cedrela odorata</i>	1	0.07	0.27	0.12	0.11	0.15
<i>Calicophyllum brasiliensis</i>	1	0.07	0.24	0.12	0.10	0.14
<i>Cordia sellowiana</i>	2	0.14	0.05	0.24	0.06	0.14
<i>Lindackeria paraensis</i>	1	0.07	0.24	0.12	0.10	0.14
<i>Vochysia surinamensis</i>	1	0.07	0.24	0.12	0.10	0.14
<i>Xylopia frutescens</i>	2	0.14	0.05	0.24	0.06	0.14
<i>Brosimum rubescens</i>	1	0.07	0.23	0.12	0.10	0.14
<i>Duguetia echinophora</i>	2	0.14	0.04	0.24	0.06	0.14
<i>Pseudolmedia laevigata</i>	2	0.14	0.05	0.24	0.06	0.14
<i>Virola</i> sp.	2	0.14	0.04	0.24	0.06	0.14
<i>Parinari montana</i>	2	0.14	0.03	0.24	0.06	0.14
<i>Parkia paraensis</i>	1	0.07	0.22	0.12	0.10	0.14
<i>Minquartia guanensis</i>	2	0.14	0.14	0.12	0.09	0.13
<i>Eschweilera</i> sp. 1	2	0.14	0.13	0.12	0.09	0.13
<i>Anacardium giganteum</i>	1	0.07	0.17	0.12	0.08	0.12
<i>Agonandra brasiliensis</i>	2	0.14	0.09	0.12	0.08	0.12
<i>Erythrina</i> sp.	1	0.07	0.15	0.12	0.07	0.11
<i>Duroia</i> sp.	1	0.07	0.14	0.12	0.07	0.11
<i>Apeiba burchellii</i>	1	0.07	0.13	0.12	0.07	0.11
<i>Dimorphandra</i> sp.	2	0.14	0.05	0.12	0.06	0.10
<i>Ormosia</i> sp.	1	0.07	0.12	0.12	0.06	0.10
<i>Protium polybotrium</i>	1	0.07	0.12	0.12	0.06	0.10
<i>Pouteria golosa</i>	2	0.14	0.04	0.12	0.06	0.10
<i>Coussapoua</i> sp.	1	0.07	0.11	0.12	0.06	0.10
<i>Miconia</i> sp.	2	0.14	0.03	0.12	0.06	0.10
<i>Urera</i> sp.	2	0.14	0.03	0.12	0.06	0.10
<i>Attalea speciosa</i>	1	0.07	0.09	0.12	0.05	0.09
<i>Chrysobalanaceae</i> Indet.	1	0.07	0.09	0.12	0.05	0.09
<i>Inga guianensis</i>	1	0.07	0.09	0.12	0.05	0.09
<i>Stryphnodendron guianense</i>	1	0.07	0.09	0.12	0.05	0.09
<i>Tabebuia serratifolia</i>	1	0.07	0.09	0.12	0.05	0.09
<i>Licania heteromorpha</i>	1	0.07	0.08	0.12	0.05	0.09
<i>Pouteria Freitasii</i>	1	0.07	0.08	0.12	0.05	0.09
<i>Protium</i> sp.	1	0.07	0.08	0.12	0.05	0.09
<i>Eugenia</i> sp.	1	0.07	0.07	0.12	0.05	0.09
<i>Neoxythece elegans</i>	1	0.07	0.07	0.12	0.05	0.09
<i>Sapindaceae</i> indet.	1	0.07	0.07	0.12	0.05	0.09
<i>Couratari guianensis</i>	1	0.07	0.06	0.12	0.04	0.08
<i>Maytenus</i> sp.	1	0.07	0.06	0.12	0.04	0.08
<i>Astrocaryum mumbaca</i>	1	0.07	0.05	0.12	0.04	0.08
<i>Byrsonima amazonica</i>	1	0.07	0.05	0.12	0.04	0.08
<i>Ocotea glandulosa</i>	1	0.07	0.06	0.12	0.04	0.08
<i>Ocotea glomerata</i>	1	0.07	0.05	0.12	0.04	0.08
<i>Pourouma bicolor</i> subsp. <i>digita</i>	1	0.07	0.06	0.12	0.04	0.08
<i>Prunus myrtifolia</i>	1	0.07	0.05	0.12	0.04	0.08
<i>Eriotheca longipedicellatum</i>	1	0.07	0.04	0.12	0.04	0.08
<i>Ficus paraensis</i>	1	0.07	0.04	0.12	0.04	0.08
<i>Hymenolobium</i> sp.	1	0.07	0.04	0.12	0.04	0.08
<i>Inga fagifolia</i>	1	0.07	0.04	0.12	0.04	0.08
<i>Labatia macrocarpa</i>	1	0.07	0.04	0.12	0.04	0.08
<i>Manilkara huberi</i>	1	0.07	0.05	0.12	0.04	0.08
<i>Psidium acutangulum</i>	1	0.07	0.04	0.12	0.04	0.08
<i>Bocageopsis</i> sp.	1	0.07	0.03	0.12	0.03	0.07
<i>Cupania scrobiculata</i>	1	0.07	0.03	0.12	0.03	0.07
<i>Sloanea garckeana</i>	1	0.07	0.03	0.12	0.03	0.07
<i>Sterculia</i> sp.	1	0.07	0.03	0.12	0.03	0.07
<i>Symphonia globulifera</i>	1	0.07	0.03	0.12	0.03	0.07
<i>Trattinickia rhoifolia</i>	1	0.07	0.03	0.12	0.03	0.07

APÊNDICE 5. Parâmetros fitossociológicos das espécies da floresta ombrófila aberta com cipó e palmeira da área de estudo da região de Belo Monte, Pará. NI - número de indivíduos; DR - densidade relativa; DoR - dominância relativa; FR - frequência relativa; IVC - índice de valor de cobertura; IVI - índice de valor de importância da espécie.

(conclusão)

ESPÉCIE	NI	DR (%)	DoR (%)	FR (%)	IVC (%)	IVI (%)
<i>Alibertia myrciifolia</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Aniba canelilla</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Aniba</i> sp.	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Annona montana</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Balizia pedicellaris</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Byrsonima</i> sp.	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Capirona decorticans</i>	1	0.07	0.03	0.12	0.03	0.07
<i>Couratari</i> sp.	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Couratari stelata</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Cydista aequinoctialis</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Diospyrus melinonii</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Enterolobium schomburgkii</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Fagarea guianense</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Hirtella racemosa</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Neea</i> sp.	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Perebea mollis</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Piper</i> sp.	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Pouteria jariensis</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Pseudolmedia laevis</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Sandwithiodoxa egregia</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Sapindus saponica</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Sclerolobium</i> sp.	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Simaba cedron</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Sizygiopsis pachicarpa</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Swartzia polyphylla</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Vismia cayennensis</i> var. <i>sessil</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Xylopia cayennensis</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Zygia inaequale</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Aspidosperma desmanthum</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07

<i>Aspidosperma excelsum</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Casearia javitensis</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Ceiba pentandra</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Chrysophyllum</i> sp.	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Clarisia ilicifolia</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Combretum laxum</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Cordia exaltata</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Diospyrus poeppigiana</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Diospyrus</i> sp.	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Eschweilera amazonica</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Ferdinandusa</i> sp.	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Gustavia poeppigiana</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Inga brachystachys</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Inga gracilifolia</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Inga ingoides</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Inga nitida</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Lecythis serrata</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Licania</i> sp.	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Miconia cuspidata</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Mouriri myrtiflora</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Neea macrophylla</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Ormosia holerythra</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Ouratea discophora</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Psychotria</i> sp.	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Rheedia acuminata</i>	1	0.07	0.02	0.12	0.03	0.07
<i>Roupala</i> sp.	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Swartzia arborescens</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Unonopsis guaterioides</i>	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07
<i>Xylopia</i> sp.	1	0.07	0.01	0.12	0.03	0.07