

DIFTERIA - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	4646	3848	3297	3345	2914	2023	1580	1284	987
NORTE	76	57	70	24	34	78	29	32	16
Rondônia	3	9	15	4	14	5	6	2	1
Acre	4	5	-	1	3	8	3	2	-
Amazonas	63	31	46	14	10	57	16	28	13
Roraima	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Pará	5	9	9	3	6	8	4	-	2
Amapá	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	2035	1606	1524	1850	1625	943	722	627	435
Maranhão	10	20	21	33	22	5	18	8	5
Piauí	32	15	19	18	79	32	11	10	14
Ceará	99	151	257	306	380	172	118	97	42
Rio Grande do Norte	117	291	290	163	243	132	68	49	13
Paraíba	211	150	126	145	92	50	43	25	26
Pernambuco	1077	465	463	676	340	230	157	170	123
Alagoas	84	112	137	161	145	66	48	62	29
Sergipe	53	25	47	115	72	34	39	35	29
Bahia	352	377	164	233	252	222	220	171	154
SUDESTE	1239	1035	824	799	623	505	423	292	229
Minas Gerais	503	368	446	435	246	253	140	139	137
Espírito Santo	21	15	4	12	14	1	5	14	9
Rio de Janeiro	427	312	276	218	271	198	144	92	50
São Paulo	288	340	98	134	92	53	134	47	33
SUL	1204	1037	735	501	467	375	325	281	249
Paraná	432	298	213	79	100	135	102	63	39
Santa Catarina	300	221	232	161	160	71	86	72	77
Rio Grande do Sul	472	518	290	261	207	169	137	146	133
CENTRO-OESTE	92	113	144	171	165	122	81	52	58
Mato Grosso do Sul	28	48	39	27	39	28	35	24	24
Mato Grosso	7	1	12	30	49	40	18	10	23
Goiás	54	55	76	103	70	41	15	11	9
Distrito Federal	3	9	17	11	7	13	13	7	2

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado do Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.