

LEISHMANIOSE - Distribuição de casos notificados em maio de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996 MAIO			1997* MAIO		
	TEGUMENTAR	VISCERAL	TOTAL	TEGUMENTAR	VISCERAL	TOTAL
BRASIL	2489(a)	249	2738	1802(b)	190	1992
NORTE	863	17	880	450	10	460
Rondônia	112	-	112	86	-	86
Acre	30	-	30	33	-	33
Amazonas	61	-	61	125	-	125
Roraima	72	8	80	38	-	38
Pará	501	3	504	...	-	0
Amapá	46	-	46	115	-	115
Tocantins	41	6	47	53	10	63
NORDESTE	1014	213	1227	871	178	1049
Maranhão	336	20	356	300	15	315
Piauí	6	24	30	6	22	28
Ceará	187	14	201	140	18	158
Rio Grande do Norte	5	5	10	7	7	14
Paraíba	11	6	17	24	10	34
Pernambuco	95	18	113	72	12	84
Alagoas	16	7	23	6	-	6
Sergipe	-	12	12	7	18	25
Bahia	358	107	465	309	76	385
SUDESTE	148	17	165	61	-	61
Minas Gerais	78	14	92	...	-	-
Espírito Santo	20	-	20	23	-	23
Rio de Janeiro	15	3	18	38	-	38
São Paulo	35	-	35	...	-	-
SUL	51	-	51	-	-	-
Paraná	51	-	-	...	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	347	2	349	321	2	323
Mato Grosso do Sul	10	2	12	44	1	45
Mato Grosso	302	-	302	241	-	241
Goiás	35	-	35	36	1	37
Distrito Federal	-	-	-	...	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI/DEOPE

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

(a) Acrescidos 66 casos notificados pelas UF's como não autóctones.

(b) Acrescidos 99 casos notificados pelas UF's como não autóctones.