

LEISHMANIOSE - Distribuição de casos notificados em julho de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	TEGUMENTAR	VISCERAL	TOTAL	TEGUMENTAR	VISCERAL	TOTAL
BRASIL	2295(a)	210	2505	1641(b)	149	1820
NORTE	699	22	721	371	9	380
Rondônia	130	-	130	98	-	98
Acre	18	-	18	55	-	55
Amazonas	57	-	57	113	-	113
Roraima	45	3	48	17	-	17
Pará	385	9	394	...	-	-
Amapá	25	-	25	60	-	60
Tocantins	39	10	49	28	9	37
NORDESTE	842	178	1020	731	163	894
Maranhão	287	11	298	323	8	331
Piauí	6	16	22	2	15	17
Ceará	133	17	150	155	11	166
Rio Grande do Norte	3	7	10	-	9	9
Paraíba	12	9	21	17	5	22
Pernambuco	55	32	87	45	-	45
Alagoas	7	6	13	26	22	48
Sergipe	-	16	16	5	8	13
Bahia	339	64	403	158	85	243
SUDESTE	137	9	146	44	7	51
Minas Gerais	85	9	94	...	7	7
Espírito Santo	21	-	21	29	-	29
Rio de Janeiro	8	-	8	15	-	15
São Paulo	23	-	23	...	-	-
SUL	30	-	30	19	-	19
Paraná	30	-	30	19	-	19
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	500	1	501	418	-	418
Mato Grosso do Sul	16	1	17	-	-	-
Mato Grosso	463	-	463	389	-	389
Goiás	21	-	21	29	-	29
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI/DEOPE

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

(a) Acrescidos 87 casos notificados pelas UF's como não autóctones.

(b) Acrescidos 58 casos notificados pelas UF's como não autóctones.